

識  
病  
捷  
法

識病捷法卷之五

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

噎痛門

附番胃共二十五名

噎者凡遇飲食覺有阻滯嚥之不下乃是六腑所成氣為病也痛者膈在心肺之間上下不通若格拒之狀是五臟所生血為病也皆三因氣聚成痰痰之積久血液俱疼血液枯槁在上近咽之下湯可飲物難食名曰噎血液枯槁在下與胃相近食

可食良久復出名曰嘔痛日久胃氣太虛朝食暮吐名曰翻胃名雖不同病出一體徒有別名治之則一男多因下元虛冷女多由氣血虛損全在切脉用藥先難擬治雖有古方恐不對病脉理治法細開五噎五痛條下貴乎臨時審察此症乃神思間病非藥能療惟內觀自養始可獲生矣

○生脉

浮緩

○死脉

沉細

○翻胃難治脉

緊瀯

○不治症<sub>名三</sub>

羊高

肉脫

糞如羊屎

○死症<sub>名四</sub>

吐臭痰

吐痰血

吐寸虫

口沫大出

○治法

凡噎痛大率宜疎氣化痰生血降火和胃之劑  
更加童便竹瀝姜汁韭汁牛羊乳六味不可  
缺也

凡翻胃腹內有虫須用驢尿驢尿有毒不可服  
多要熱飲

凡翻胃切不可用香燥藥

凡噎痛用糯米為末以牛涎拌作小丸蒸熟食  
之遂愈隨服調理藥取牛涎法將荷葉包牛  
口使走力乏涎大出收用

凡噎痛用馬剝兒燈燒存性一錢好棗肉平胃  
散各一錢酒調服食即可下馬剝兒即野苢  
瓜味帶酸黃時香其皮色肉味一似家園甜  
瓜如鷄子大北方多有

凡噎膈痰實火盛之人先以瓜蒂散吐之後用  
大黃角黑丑朴硝等分粥丸服

凡癰病初起因內傷外感而致痞塞吞酸嘈雜  
等症用辛香燥熱之藥劫之而愈復病復劫  
延久成噎膈

凡噎膈氣虛用四君子湯血虛用四物湯有熱  
加黃柏有痰加貝母宜淡薄滋味

凡噎膈有氣者用童便浸香附蒸熟用

凡噎膈有陰火上炎者用黃柏知母玄參

凡噎膈有積血者用桃仁承氣湯為丸食後酒

送下五十九隔一日服一次十次為止其藥

韭汁糊丸

五噎

氣結咽間則成五噎結者結聚之義其症妨礙飲食吐之不出嚥之不下

憂噎

關部脉結伏用開鬱氣藥

怒噎

兩關脉俱絃甚用抑氣順氣藥

勞噎

關部脉大無力人參為主

食噎

其脉短瀯用消導藥其症食後心下隱隱然痛不可忍吐出痛止

氣噎

寸關脉沉瀯用開滯導氣藥○七情之氣其

脉緩瀯用疎氣藥

五痛

氣結胃間則成五痛其症胸膈痞滿嘔吐煩悶食不下噎氣吞酸時聞食臭大小便閉

風痛

厥邪其脉浮絃防風為主其症食入即吐此

心經中風邪

寒痛

寒邪其脉沉遲炒黑乾姜為主其症痛出飲  
食此肝經中寒

熱痛

熱邪在胃右關脉數大用黃連為主

痰痛

痰邪在胃寸關脉沉或浮大二陳湯為主

水痛

血氣不足停水積飲在胃脘即臍冷脾不磨  
化宿食食不化隨逆氣而吐右關脉沉無力  
用白朮當歸澤瀉葶藶山朮姜汁為主

翻胃

因噎痛日久或食燥熱藥大便自結食不得食  
食則反出

如氣虛用四君子湯右寸口脉無力

如血虛用四物湯左寸關脉無力○先服秦椒  
剪紅丸去瘀血痰蚘次服大効散不愈再於臍

仙方內選用

三陽結為噎

小腸熱結則血脉燥

大腸熱結則大便不通

膀胱熱結則津液涸

已上三陽既結則大小便不通氣反上行食  
噎不下此皆熱症並服化鐵丸

諸氣為噎

怒氣飲食噎塞不下用桔殼青皮

勞氣為咽噎喘促用三白湯為主

思氣為中噎用撫芎貝母枳實炒

三焦氣閉塞為咽噎不利用黃柏枳殼

陰中伏陽為噎

噎為七情所發或因三焦傳化失常皆主于氣

也或胃脘血液虧少○服通幽湯

三焦為痛

上焦吐是氣也其脉浮洪其症食已暴吐渴飲  
水大便結氣上衝胸作痛治宜降氣清熱  
中焦吐是積也食與氣併作痛其関脉浮先痛  
後吐或先吐後痛○服木香枳榔丸

下焦吐是寒也其脉沉遲朝食暮吐小便清大  
便不通治宜通其閉塞散其寒氣和中焦  
瘀血為痛

或被人打傷或墮跌內傷或好熱飲食或多怒

積瘀血在內忽吐不食○服棗仁承氣湯  
脾敗為痛

食罷即吐朝食暮吐酸臭黃水○服安脾散  
壯年翻胃

用益元散加陳皮半夏姜汁竹歷甘蔗汁  
化鐵丸

五靈脂去沙石青皮炒陳皮各一兩陳倉米一合

巴豆三十五粒去油先炒五靈脂香透次下青皮炒色

變又下陳皮亦炒色變陳米同巴豆炒黃色揀  
出巴豆以紙攤在地上出火毒各為末米醋為

丸如綠豆大每服十五丸加至二十丸男用茶送下女用醋湯送下

秦椒剪紅丸

雄黃

木香

各五錢

枳郎

三稜

蓬朮

貫仲

乾漆

陳皮

各一兩

大黃

兩半

為末

麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前米湯送下

敵痰丸

半夏麴

枯礬

各一兩

皂角

二兩

黑牽牛

炒二兩

為末蘿蔔煮爛和藥丸如梧桐子大每服五十

丸食後薑湯送下

五膈丸

琥珀錢一

訶藟勒

木香

陳皮

昆布

桃仁

白朮

錢各三

肉桂

半夏

枳殼

五味

煨即

大黃

錢各五

為末煉蜜丸如

梧桐子大每服三十丸空心薑棗湯送下

五噎散

人參

桔梗

半夏

白豆蔻

木香

沉香

華澄茄

枇杷葉

生薑

白朮

各一錢

甘草

五分

右水二鍾半薑三片棗一

枚煎至一鍾食後服

# 大効散

田螺殼黃蛻殼二件不拘多少在土中多年陳者尤佳各另燒成白灰研細每料用田螺壳灰二兩黃蛻壳灰一兩烏梅肉四兩同搜和作團以砂礮盛蓋鹽泥固濟火煨令焦黑存性取出研細每服二錢砂仁湯調下

# 安脾散

良薑一兩以百年牆上土三合敲碎用水二碗煮乾薄切成片南木香草 陳皮人參白茯苓

白木胡椒丁香各三錢甘草五錢為末每服二錢食前米湯調下

十隔散

人參 茯苓 肉桂 枳壳 甘草

神麴 麥芽 訶藁勒 蓬朮 二棱

生薑 陳皮 白朮 厚朴 煨郎

木香各五錢為末每服二錢白滾湯調下如脾胃

不和腹脇脹滿用水一盞薑七片棗一枚鹽少

許煎服

通幽湯

桃仁

歸身

各一錢

生地

熟地

各二錢

升麻

紅花

五分

枳郎末

一錢

右水煎調枳郎末服

三白湯

白朮

白芍藥

白茯苓

各等分

右用水煎服

平胃散

陳皮

甘草

蒼朮

厚朴

各等分

右為

末生薑湯調服

青蒂散

見脾胃門

木香枳榔丸

見秘傳

四物湯

見諸血門

桃仁承氣湯

見諸血門

二陳湯

見咳嗽門

四君子湯

見脾胃門

仙方

開末

# 痞滿門

有八名

此門與脹門互相查考治病

痞與否同不通泰之謂有陰伏陽蓄氣與血不運而成處心位中央膜滿與脹論輔重之分痞則內覺痞悶外無脹急之形脹滿外有形也前人皆以誤下為裡氣虛而致之傷寒表邪乘虛入於心下雜病受邪亦蓄心下世俗不明此理往往用峻快藥下之多致於危可不痛哉

○總脈

寸脉沉濡

關脉浮絃

○辯分痞滿虛實

虛痞大便利少食

實痞大便秘能食

○治法

凡治痞要問曾患傷寒可曾經下

如傷寒經下在傷寒門治

凡治痞要問曾患雜病可曾經下

如雜病經下甘草瀉心湯

凡治痞宜用升胃氣以氣血藥煎

妙用升麻白朮當歸酒洗

凡治痞切不可全用尅氣之藥也

凡痞滿服通利藥必變成中滿膨脹

凡痞滿有中氣虛弱而成其症者用補中益氣湯  
凡痞滿有濕熱太甚而成其症者用五苓散  
凡痞滿有瀉痢失血而成其症者用四物湯  
凡痞滿有傷於飲食而成其症者用白朮  
汗下後痞滿

服半夏瀉心湯去乾姜加生姜四兩  
下後腹中雷鳴痞滿

服甘草瀉心湯

一切心下痞滿年久不愈

服大消痞丸

右關浮絃惡食懶倦虛痞

服枳實消痞丸

停痰痞滿

服消飲丸

三焦痞滯水飲停積脇滿

服三腕痞氣丸

憂氣結胸中腹皮微痛不思食痞滿

服木香消痞丸

內傷痞滿

服補中益氣湯

半夏瀉心湯

半夏

洗半升

黃連

兩一

乾姜

人參

各三兩

黃芩

甘草

兩各三

大棗

枚十二

右用水一斗煮取六升溫

服一升一日服三次

甘草瀉心湯

即前半夏瀉心湯去人參加甘草一兩

大消痞丸

黃連

炒

黃芩

炒各六錢

姜黃

白朮

炒

甘草

砂仁

乾姜

神麴

各炒

人參

陳皮

楮苓

各二錢

澤瀉

厚朴

各炒

半夏

錢四

枳實

五錢 右為末姜汁糊丸如梧桐子大每服五十丸  
起至百丸止百滾湯送下

枳實消痞丸

枳實炒 黃連炒 乾姜各錢五 大麥麴錢二 茯苓

甘草各錢半 人參錢三 半夏錢二 厚朴姜製錢四 白朮

炒二錢 右為細末濃米飲為丸如梧桐子大食後

白滾湯送下五十丸

三腕痞氣丸

木香 白豆蔻 京三稜煨 青皮炒各錢一兩 檳榔

砂仁 沉香各錢五 半夏姜汁拌蒸 大腹子 陳皮

各二右為末神麴糊為丸如梧桐子大每服三  
十九加至六十丸食後白滾湯送下

木香消痞丸

木香

錢五

柴胡

錢四

陳皮

錢三

半夏

錢一

乾姜

歸尾

錢三

紅花

錢五

右為末濃米飲為丸服

木香枳榔丸

見大

便明

補中益氣湯

見注

夏門

四物湯

見門

血

五苓散

見門

泄

消飲丸

見末

卷

# 眼科

有七十二名

余不專於是科凡遇斯疾真心辭之考究諸書不得精詳惟徽州府刊行七十二症有詩七十二首不甚盡善又覓七十二問與七十二症名少異摘而梓之

第一問人身中天地所稟貴者何也

岐伯答曰人身最貴是眼眼者如天之日月盈  
衰清朗不可不明也

第二問人之眼或患者何也

答曰善哉問也或因酒色或犯憂愁或因思慮或受悲哭或食醎酸使氣不營肝經肝經損眼即病矣

第三問目赤痛者何也

答曰此五積毒流傳於肝木乃肝之外像受熱邪使血散亂流經於目故赤痛也當以酒調散當歸散四順散八正散主之老人赤腫風症也第四問目赤不痛者何也

答曰此肝之實肝者血之源其候於目肝實則血盛盛則汙注四散血氣上灌衝行於目血侵

於睛睛受其血所以赤而不痛也當以撥雲散  
當歸散道赤散治之

第五問赤而昏者何也

答曰此肝之虛也肝屬於木木生火火發則木  
滅火屬心心生血血生瞳目皆侵於瞳人故赤  
而昏也當以當歸活血煎黃芪丸主之

第六問大眚赤者何也

答曰此心之實也五輪分布大眚屬心心為帝  
主位南方其像火赤色大眚赤者心實也當以  
三黃丸菊花散急應散主之

第七問小昏赤者何也

答曰此心虛也心者五藏之主六府之宗上應熒惑星其病屬南方之火當以硃砂膏人參茯苓煎定志丸主之

第八問眵出結凝者何也

答曰此肺之實也肺者西方金金生水水滿則怀溢病本肺生其色故白經云淚本屬肺肺之津液出目為眵結而凝者肺實也當以嗎肺散主之

第九問眵淚不結者何也

答曰此肺之虛也肺屬金金受心之邪金得火  
衰而化水水汙溢出故淚常汙而不結當以阿  
膠散艾煎丸主之

第十問羞明怕日者何也

答曰此脾之實也脾屬土土化濕濕氣傳於肝  
肝受脾之邪上騰於目目受脾濕氣脾主肌肉  
壅熱難開明屬太陽真氣氣勝其濕土濕熱相  
勝津華灌結不榮於目故羞明也當以密蒙花  
散千里光丸主之

第十一問視物不明者何也

答曰此肝藏虛也眼有五輪屬五藏有黑睛有  
白睛有青睛有赤睛有黃睛黃輪屬脾即褐睛  
也目本應肝其色青屬木脾屬土本木尅土青  
黃相爭黃不勝青目睛遭雜而視物不真也當  
蒼朮湯主之

第十二問茫茫黑花者如蠅羽何也

答曰腎藏太實也腎屬水其蠅羽象黑也腎者  
肝之母母能榮子肝受腎之邪傳經膽膽者目  
之經腎肺入目時復茫茫如蠅羽者腎之實也  
當以猪苓湯苦參湯主之

第十三問迎風有淚者何也

答曰腎虛也五輪論曰黑睛為腎經曰肝屬木  
木生風腎屬水水不勝風目乃神水之源故迎  
風有淚也腎之虛也當以地黃丸慈子主之岐  
伯以晚發沙湯艾煎丸素問曰淚者肝之液也  
迎風淚出者腎虛也眵者出肺又液者出心流  
而不覺者出於肝虛也

第十四問赤筋附睛者何也

答曰此心剋肝也心屬火火主血肝屬木木主  
筋血侵於睛者肝之候也目者肝司也流傳於

目即漸灌交故曰赤筋附睛也當以大黃當歸散主之有瞳而生赤筋至腎者腎疔腎熱也緣腎者少陰之經化君火者也

第十五問白膜遮睛者何也

答曰此是肺尅肝也肺屬金肝屬木金尅木金色白木化為風風邪在肺其經木旺白輪勝風輪白輪者青輪之復即漸灌變是子母邪尅子化也白膜遮睛者金尅木也當以連翹湯密蒙花散蟬花散主之

第十六問迎風麥痒者何也

荅曰肝之邪自傳肺也肝屬風風燥動動即痒也當以二霜膏青鹽膏苦芥子散主之

第十七問早晨昏者何也

荅曰此頭風攻注也頭者六陽之會肝藏屬陽早晨真陽欲旺其目昏者為六陽脉俱朝也在寅卯之時寅卯為木主風故為頭風攻注也當以芎藭石膏丸白蒺藜散主之

第十八問日中昏者何也

荅曰此痰之所作也在巳午之時火旺於心今火勝肺肺實壅痰兩暈暈而昏也當以半夏丸

辰砂丸螭蛻丸主之也

第十九問夜晚昏者何也

荅曰腦之損也腦者天真之物行於陰道而不  
行陽也故在申酉戌時寒氣欲生腦損則風寒  
所至目睛所昏不甚者當以灸風府穴

第二十問晝日害痛者何也

荅曰此陽毒盛也經曰晝則陽生夜則陰長少  
陽者膽之旺在寅絕在申乃一陰之氣也故夜  
則不痛晝則痛也當以瀉心湯乳香丸主之

第二十一問夜則痛者何也

答曰此陰毒盛也經曰陰好靜陽好動血氣散漫而行陰道寒邪繞之使邪氣火盛夜氣屈陰旺在申從申時痛至寅時者陰之去也當以回陽散補真九乳香丸主之

第二十二問浮翳遮睛者何也

答曰肺經火熱也肺者西方金其色白肺者氣之源氣勝則熱血勝則寒肺之熱氣灌注瞳人瞳人者目之根白膜者肺之苗根實寒苗勝白膜遮睛乃肺經大熱也當以瀉肺湯順氣散三黃丸主之

第二十三問抱螺突出睛者何也

答曰此睛之損也睛者五藏之源六府之宗也  
府積毒外發癰疽肝藏偏裒而發於目本患  
瘡膿血結硬真睛突出故曰抱螺突出也當以  
救睛丸蟬花散珍珠膏琥珀珊瑚膏主之抱螺  
翳者有赤睛突出有傷寒陽毒返睛熱而出有  
小兒瘡疹而出

第二十四問眼睛倒入者何也

答曰此五藏之損也眼應五行外顯青黃赤白  
黑內應心肝脾肺腎五藏之宗睛深枯入者五

藏之損也當以真人五補丸主之枯入者此五  
藏六府之損也損者緣五藏虛弱而受眼疾醫  
以重藥消之故見睛疼重藥者邪熱相隨隨藥  
泄下即枯也

第二十五問青膜遮睛者何也

答曰此外障也目者腎水之源精華之府五藏  
積蘊熱氣攻衝外發於目目屬於肝其色青故  
主青膜也當以蟬花散洗肝散桑螵蛸丸退翳  
復明膏珊瑚琥珀膏救睛丸決明丸主之

第二十六問瞳人背側者何也

諸病雜論卷五  
答曰此內障也五行應變外降為先氣血皆衰  
榮衛凝滯不能榮於目故瞳人則倒也當以救  
睛九當歸鹿茸丸夜光椒紅丸地黄丸活血煎  
麻黃生犀丸五肝丸珊瑚琥珀膏當歸散五參  
丸主之

第二十七問頭暈昏朦目前赤白星亂者何也

答曰此血之聚也血者經也周流百脉血衰則  
百脉不旺六陽不舉頭暈昏蒙頭者六陽之首  
也陽經不行則頭目昏暈也當以芎藭石膏丸  
當歸活血煎石膏散主之

第二十八問不痛痒赤昏者何也

答曰此氣衰也。榮屬陰，衛屬陽。陰好靜，陽好動。氣血流行，升降即榮衛通矣。血結則癰疽，氣滯則麻痒。痒則不痛不痒，但赤而昏，當以透經勻氣丸通明。蟬花散順氣丸主之。

第二十九問赤而熱痛者何也

答曰此血實也。緣經屬陽，絡屬陰。經主血，絡主氣。氣勝則肺壅，血勝則肝實。外應於兩目，赤而熱痛者，血實也。當以大黃當歸散牡丹丸主之。

第三十問血浸睛者何也

卷之三  
答曰此肝經虛熱也目者肝之應津液之道宗  
脉之所聚也有邪熱客於肝肝虛血脉流傳於  
兩目赤而侵睛也當以五靈散及補肝丸連翹  
湯主之不退則名曰血灌睛注瞳人泄也

第三十一問久昏如遮者何也

答曰此衛經實也衛主氣經云榮在上而為天  
衛在下而為地素問清氣分輕為天黑氣重濁  
為地清陽發腠理濁陰走五藏肝受衛之邪氣  
流傳於目故昏而遮也當以木賊湯連翹湯主  
第三十二問痛而增寒者何也

答曰此衛氣之虛也衛屬陰而為陽榮屬陽而為陰經曰榮者肝之司衛者腎之府皆北方壬癸水衛來歸府故增寒也當以附子猪苓湯白朮散益黃散主之

第三十三問痛而體熱者何也

答曰榮衛之實也經曰榮屬陽能發熱衛屬陰能發寒陰陽之道路在上屬心與肺在下屬腎與肝痛而發熱者邪在心心者手少陰君火之化而發炎熱也當以洗心散解肌散菊花餅子大黃當歸散主之

第三十四問乍明乍暗者何也

答曰榮之虛也榮衛者陰陽之祖血氣之宗榮衛流利氣血朝行榮衛相爭榮不及於衛則復不明乍暗也當以調氣丸當歸艾煎丸夜光椒紅丸主之乍明乍暗有随心氣者心喜則明憂愁則暗亦皆有之

第三十五問左目右目何也

答曰此陰經之旺也經曰有陽中之陽陰中之陰陽中之陽者心也陰中之陰者肺也心經邪熱蘊積於肺肺受心邪傳於目也左目屬太陽

右目屬太陰左目傳右目者太陽經旺也當以木通散三黃丸洗心散主之

第三十六問右目傳左目者何也

答曰此陽之症也脉有陽經有陰經有陽絡有陰絡之屬氣肺之經其經繫於右目右目傳左目者是肺經有邪熱絡肺太旺當以瀉肺湯橘皮湯導赤散主之

第三十七問左右相傳者何也

答曰此邪氣攻衝也肝藏不足為風邪所使熱氣相爭左右往來脉有偏勝偏邪故往來相爭

也當以蚕紙散芍藥湯分珠散主之

第三十八問赤而痒澁者何也

荅曰肝者厥陰之經而化風內邪相攻風濕相搏血氣痞澁時復風邪動作而發痒澁也當以芍藥湯二霜膏清華散主之

第三十九問兩臉赤爛者何也

荅曰此風邪濕氣攻也目者精華之宮竟鬼所聚血脉之源陰陽之會經絡之宗風邪克於嗔理濕氣相爭停於兩臉之內因而浸注濕爛也當以麻黃省風湯除濕二礬丸主之

第四十問眼睛通黃者何也

答曰此酒之毒也或承渴時飲酒如漿或飲之  
腹痛滲入四肢隨經絡注流上下往來夜隨血  
氣朝於肝夜至晨朝於目故引酒之毒灌注入  
於瞳人使目睛之黃也當以雄黃丸管仲湯主  
之或有太病之後新痊血氣不足亦積睛黃伏  
暑邪之氣積入於睛輪與白赤有黃也

第四十一問目不遠視者何也

答曰此勞傷五藏也目者肝之外候風邪克之  
使精華之氣衰弱肝氣不足致不能遠視也當

以補肝散蟬花散主之

第四十二問年年發者何也

答曰此乃隨天令而病也經曰冬至之後少陽旺復得甲子陽明旺復得甲子太陽旺復得甲子太陰旺復得甲子少陰旺復得甲子厥陰旺旺各六十日六六三百六十日其氣一周假人之太陽經受痛得於來年夏至前六十日而發也當以隨經流利假如太陽受病只流利太陽

第四十三問拳毛倒睫者何也

答曰此肺之損肺者五藏之華蓋主於皮毛經

曰一損損於皮毛皮聚而毛落拳毛倒睫者肺之損也當以補肺湯阿膠煎主之

第四十四問積年細小者何也

荅曰此脾之損也經曰肌肉者脾之主肌肉消瘦飲食不成肌膚外感風邪克於脾理使肌肉緊急積毒於目故細小也當以人參和脾湯四物猪肚丸麻黃省風湯主之

第四十五問勞肉侵睛者何也

荅曰此脾之毒也脾者倉廩之官肌肉之府毒氣攻衝肌肉壅塞邪氣衝於肝肝受脾毒邪傳

於目努而出者或以努力而生當以大防風丸  
三黃丸青鹽膏蕤仁膏主之有怒氣而生努肉  
不可割

第四十六問數年赤者何也

答曰風熱傷肝也肝主目風熱傷之則目昏赤  
肌肉虛弱則風邪熱氣不去故積年不瘥當以  
麻黃省風湯當歸活血煎牡丹丸主之此因赤  
眼者以冷藥點嚙血冷凝故數年赤也

第四十七問兩目非時腫者何也

答曰此風腫也目者肝之候肝不足則風邪上

衝目外兩臉結核數年不愈而發故腫也  
當以犀角消毒飲洗心散瞿麥散主之

#### 第四十八問珠子脫出者何也

答曰藏府陰陽不和也目者陰陽之精竟鬼之  
宗肝藏之候風熱痰飲積於藏府之間陰陽不  
和蘊積生熱攻衝於目使睛疼痛老者風虛乍  
入於腦故腫人脫出當以救睛丸陰陽二和散  
主之也

#### 第四十九問眼前而時黑者何也

答曰此肝之虛也目者肝之候藏府之華氣血

之宗津液血氣不足肝虛不能榮於目神影昏  
亂時時見紗帛之黑也當以夜光紅丸補肝虛  
芎藭丸收睛丸主之

第五十問目中飛火者何也

答曰此厥陰經之旺也其脉起於足大指之端  
從之於血血氣太旺風熱相盛故目中飛火也  
當以芎藥湯夜光椒紅丸主之

第五十一問目澁者何也

答曰此藏府勞動也或即悲哭或因淚出過極  
冷淚不止津液道閉而不開液道枯竭藏府勞

動邪氣勝於肝冲發於目故澁也當以補肝益黃散二姜丸三霜丸主之

第五十二問大病後微昏者何也

答曰此五藏不調也陰陽否塞血氣不榮即神光無輝無輝則茫茫昏矣大體氣血皆虛也當以人參芍藥湯橘皮煎黃芪丸主之

第五十三問陽毒病後微昏者何也

答曰此下之過也五藏為陰六府為陽六經宣利藏府俱虛脾胃未和肌肉未解勞動氣血使肝藏肉動故目微昏也當以蒼朮湯黃芪丸驚

甲紫胡湯夜光椒紅丸主之

第五十四問陰毒病後微昏者何也

答曰此熱過極也或服暖藥或燒艾灸大病已退風邪冲擊新病復起肝氣大勝風火相搏攻目昏也當以三黃丸瞿麥散菊花餅子主之

第五十五問因遇水至昏者何也

答曰此水氣攻於目也如過水則兩胫先入水緣足之下者有大谿穴大溪之下名曰復溜復溜之下名曰湧泉湧泉之穴者腎之經也絡於膀胱其真者從腎上灌於肝水氣攻於兩足胫

而搏於肝肝者目之候邪氣攻之所以視昏也  
當以仙術湯猪苓散夜光椒紅丸主之

第五十六問妊婦眼昏者何也

答曰此血之病也妊孕以血養胎血不榮肝又  
氣不足故目昏也當以伏龍肝散靈光丸椒紅  
丸主之

第五十七問產後眼昏者何也

答曰五藏氣血皆虛也妊孕時當出敗血一斗  
三升肌血寬慢骨節解散筋脉中絕真氣不足  
即五藏不榮六府不安目者乃五藏六府之根

苗根苗衰故昏也當以椒紅丸當歸活血煎菊  
花餅子主之

第五十八問小兒未滿歲兩目赤爛者何也

答曰此胎赤也乃是小兒初生之時浴湯令微  
毒不盡拭之未乾留於兩目臉上外感於風故  
兩目赤爛也當以樺皮南星散黃連散主之  
第五十九問小兒瘡疹初發入於目者何也  
答曰此小兒在腹中飲其血氣食其胎胞穢毒  
瘡疹入於目中者藏府毒發也當以蚬退散犀  
角散密蒙花散主之

第六十問小兒眼生障翳者何也

答曰眼者五藏之精華肺之外應於目小兒純陽也外感風熱內有痰壅積於肝冲發於目而生翳障當以蟬花散菊花餅子珊瑚琥珀膏主之

第六十一問小兒白障者何也

答曰此肺壅痰實熱也肝屬木木者青香之物痰熱攻冲灌注瞳人瞳人內傷黑暗暗悉白漸漸散漫皆白而為白障也當以救睛丸珊瑚琥珀膏小半夏丸順肝丸主之

第六十二問小兒青盲者何也

答曰此小兒藏府虛弱內伏停飲冷氣過極不宣不通故作障翳而不見物也當以决明散蟹黃散人參菊花餅象牙羗活散主之

第六十三問雀目者何也

答曰此小兒五藏內蘊積熱風邪搏血經絡凝澁陰陽不和榮衛不通使目晝明夜暗昏如雀目也當以熊膽膏蝙蝠丸三黃丸主之

第六十四問小兒眼臉生瘡者何也

答曰此風邪客於腠理血氣相搏蓋以洗浴之

時拭而未乾穢毒侵睛遇風即發如粟米之狀連臉損爛也當以二礬丸省風三白散主之

第六十五問臉生風粟者何也

荅曰脾肺受邪也脾者肌肉之府肺者皮毛之源邪熱相搏脾經虛弱風熱相乘冲發於目臉之間如粟米之狀故為之風粟也當以鯨魚皮散熨烙省風湯主之

第六十六問青盲有翳者何也

荅曰肝者木之源目者津液之府五藏風熱相乘於氣血內攻外泄發於目睛之瞳而生翳如

蠅羽之狀當以決明丸沙魚皮散象牙屑角散  
蟹黃散人參菊花散羌活煎救晴丸上之

第六十七問眇目之候者何也

答曰眇者汜也邪風克於目津液乘之客熱於  
目此日常常發痒冷淚出不絕名曰眇當以艾  
煎丸綾綿散主之

第六十八問膿漏者何也

答曰目者五藏之宗六所之華津液之道風熱  
客於臉上津液乘之冷熱相攻瞳人內損故成  
膿也名曰漏睛當以救睛百步通神丸

第六十九問目偏視者何也

答曰陰陽之氣血脉之留風熱冲於目藏府偏勝偏衰陰陽不和故偏視也當以換經陽救睛丸五肝丸主之

第七十問眇目者何也

答曰目者藏府之精宗脉之聚血氣之源為風邪停飲經絡偏絕肌肉否澁氣血凝滯使目大小不勻故曰眇目也當以省風湯勻氣湯主之

第七十一問眼目肥者何也

答曰此邪熱冲肝五藏内成肝者上達於目使

明雅集注卷五 眼科  
瞳人洩瞳注於外或白或青或黑或赤或黃往來不定謂之肥目當以五肝丸神目定華散主之

第七十二問或針或割或取翳餘痛不止血出不止者何也

答曰目者經絡之苗五藏之源血脉之道路或針割損之即痛不止血出不止也當以三白散乳香散蟬花散主之

蒼朮湯

蒼朮

玄參

遠志

甘草

陳皮

芫蔚子

各六分

石用水一鐘煎至六分食後溫服

栝苓湯

栝苓

木通

滑石

山梔

澤瀉

狗脊

地蒲蓄

車前子

大黃

各四分

右用

水一鐘煎至六分入鹽少許溫服

苦參湯

苦參

四錢

丹參

二錢

地膚子

錢一

右用水二鐘煎

至八分食遠服粗

連翹湯

連翹

夏枯草

香附

各等分

右為末每服二

錢清桑調下

瀉心湯

當歸

大黃

生地黄

黃芩

各半

甘草

右為末每服二錢水一鍾煎八分熱服

瀉肺湯

桑白皮

地骨皮

各一兩

右入糯米

三十粒

水煎服

木賊湯

木賊

玄參

地骨皮

甘草

當歸

各半

右用水煎服

連翹湯

在三十一問內用

連翹

赤芍藥

大黃

山梔

當歸

荆芥

龍胆草

各等分

右用水煎服

附子楮苓湯

附子

去皮

楮苓

白朮

各一兩

甘草

半兩

右咀

姜三片用水煎服

芍藥湯

芍藥

川芎

甘草

生地黄

各等分

右

為末用酒調服

麻黃省風湯

麻黃

五味子

防風

天門冬

大黃

諸病皆治之

桔梗

各一兩

細辛

芍藥

各五錢

右咬咀水煎服

管仲湯

管仲

二兩

甘草

二錢半

右咬咀用水煎食後服

人參和脾湯

人參

黃芪

防風

茯苓

甘草

訶子

陳皮

地骨皮

各等分

右為末每服

二錢米飲湯調下

蒼朮湯

在五十三問內用

蒼朮

六兩

甘草

七錢五分

右為末空心鹽湯調服

鱉甲柴胡湯

鱉甲

欠醋

柴胡

知母

貝母

秦艽

蒼朮

麻黃

乾葛粉

赤芍藥

各等分

右

為細末無灰酒調服

當歸散

當歸

大黃

黃芩

龍胆草

菊花

甘草

各等分

右為末用好酒調服

酒調散

當歸

芍藥

甘草

大黃

菊花

連翹

川芎

天麻

桑螵蛸

蒼朮

羌活

麻黃

各等分

右為末每服二錢酒調下

八正散

大黃

瞿麥

滑石

甘草

木通

山梔

車前子

地篇蓄

各等分

右入燈心用

水煎服

四順散

當歸

芍藥

大黃

甘草

各等分

右用

水煎服

撥雲散

菊花

防風

甘草

蒺藜

羌活

柴胡

大黃

山梔

各等分

右水煎服

導赤散

生地黃

木通

甘草

連翹

各等分

右用

水一鍾每服七錢入竹葉三片煎七分溫服

急應散

千里急

甘草

各等分

右每服四錢水煎服

菊花散

菊花

四兩

甘草

二兩

生地

二兩

白茯苓

三兩

右為

末每服二錢米飲湯調服

瀉肺散

桑白皮

地骨皮

甘草

各等分

右吹咀每服四

錢入粳米三十粒水煎服

阿膠散

阿膠

杏仁

甘草

各五分

款冬花

五分糯米

二右以咀用水煎食後溫服

密蒙花散

羌活

菊花

石決明

木賊草

蔓荊

枸杞子

白蒺藜

青箱子

密蒙花

各等分

右為末每服二錢食後清茶下

仁燕散

石燕

一

玳瑁

二

羚羊角

一

右為末

每服一

錢薄荷湯調下

大黃當歸散

大黃

當歸

甘草

各等分

右為末新汲水

入蜜調服

苦芥子散

苦芥子

錢三

右為末用水二盞煎七分去粗溫服

白蒺藜散

白蒺藜

蔓荊子

甘菊花

白朮

甘草

決明子

覆盆子

升麻

川芎

各等分

右為

末每服二錢米泔水調下

回陽散

陳皮

枸杞子

當歸

熟地

茴香

破故紙

葳靈仙

防風

各等分

為末鹽湯調下

蟹黃散

雄黃

冰片

硼砂

乳香

牙硝

姜霜

各等分

右為極細末每用少許點眼

蛇退散

蛇退

一條

蟬退

一兩

黃連

甘草

半兩

右為細末

末蜜湯調下日三服忌毒物

胆佐麥散

瞿麥

大黃

木通

芒硝

水煎服

分珠散

梔子

蚌粉

槐花

牛蒡子

各兩

春加赤芍藥夏加當歸秋加龍胆草冬加大黃  
古為末茶調食後服

鮮肌散

赤芍藥

乾葛

麻黃

節不去

升麻

甘草

半夏

泡各時分

右吹咀用水煎服

益黃散

丁香

二兩

陳皮

一兩

青皮

甘草

訶子

錢各五 右吹咀用水煎服

白朮散

人參

白朮

茯苓

藿香

甘草

乾姜

各等分

右用水二鍾姜三片煎服

五靈芝散

五靈芝

大黃

葳靈仙

白芷

各等分

右為

末用好酒調服

大黃當歸散

大黃

當歸

牡丹皮

生地黃

黃芩

芍藥

甘草

各等分

右吹咀用水煎服

洗肝散

山梔

當歸

甘草

大黃

防風

川芎

海螵蛸

各等分

右用水煎服

順氣散

生地黃

四兩

大黃

二兩

麻黃

去節一兩

皂角

五錢炒

瓜蒌

許少右為末每服二錢熟水調下

鯊魚皮散

鯊魚

皮二兩燒

防風

麻黃

荊芥

訶子

青皮

各五錢

右為末不拘時用米飲湯調服

三白散

白芷

白朮

白僵蚕

各等分

右為細末每

服一錢姜湯下

決明散

草決明

川芎

白芷

木賊

菊花

蔓荊子

各一兩

右為末用白滾湯調下

木通散

木通

山梔

茵陳

赤芍

荊芥

大黃

防風

甘草

各等分

右為細末每服

一錢米泔水調服

象牙羗活散

羚羊角

犀角

象牙屑

琥珀

甘草

牛蒡子

防風

荆芥

羌活

各等分

右為

細末茶清調下

石膏散

川芎

錢五

石膏

二錢

藁本

細辛

白朮

甘草

各五錢

右為末茶清下

黃芪丸

黃芪

防風

白茯苓

茴香

烏藥

牡丹皮

各等分

右為細末酒糊丸如梧桐子大每

服三五十丸食前鹽湯送下婦人淡酸湯送下

三黃丸

大黃

兩四

黃芩

兩三

黃連

兩半

右為細末蜜水為

丸如梧桐子大每服二十丸溫白湯送下

定志丸

人參

遠志

天門冬

菖蒲

茯苓

各半 右為細末煉蜜為丸鷄頭大每服一丸細

爵陳皮湯送下

艾煎丸

當歸

白艾

醋炙

晚蚕沙

炒

秦艽

各半

右為

末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸桑葉湯送

下桑白皮湯亦可

千里光丸

千里光

一名明杞葉也

菊花

甘草

各等分

右為

禾煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九粒清下

地黃丸

熟地黃

遠志

當歸

芍藥

黃芪

甘草

各等分

右為末蜜丸熟湯下

艾煎丸

艾葉

諸灸

茯苓

當歸

山藥

防風

桑白皮

牛膝

甘草

各等分

右為細末煉蜜

為丸如彈子大每服一九茶清嚼下

芎藭石膏丸

石膏

芎藭

白芷

川烏

附子

羌活

甘草

仙靈脾

煨各一分

右為末蜜丸

彈子大辰砂為衣每服一九薄荷清茶嚼下

半夏丸

半夏

一兩

露蜂房

炒

南星

各一兩

僵蚕

錢五

朱砂

雄黃

各一分

五靈芝

白礬

各一分

蟬蛻

錢一

右為末

滴水丸雞頭大每服八九丸薄荷清茶湯嚼下

辰砂丸

辰砂錢一

枯礬

天麻

各二兩

杏仁

四十九个  
去皮尖

楮實

一兩

右為末水糊丸梧桐子大每服十五丸

姜湯送下

蜈蚣丸

蟬退

僵蚕

羌活

各一兩

桑螵蛸

劈破炙二兩

威靈仙

防風

各一兩

南星

半夏

當歸

各五錢

右為末姜糊為丸如梧桐子大每服二十

丸臨卧時姜湯送下

乳香丸

白蒺藜

炒

茴香

炒

川練子

地龍

烏藥

乳香

沒藥

黃芪

防風

陳皮

右等分為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸

鹽湯送下

補真丸

人參

地黃

川牛膝

各等分

右為末煉蜜

為丸梧子大每服三五十九空心鹽湯送下

加味乳香丸

乳香

沒藥

川烏

京墨

炮靈芝

附子

炮一個

百草

霜各半可

木鱉子

南星

炮

當歸

延胡索

炒

全蝎

去尾炙各一兩

右為末蜜丸彈子大每

服一九分四服薄荷湯磨化服婦人血氣當  
酒臨卧服不可食熱物

救睛丸

蒼朮

浸酒

甘草

楮實

川芎

荊芥

薄荷

當歸

蟬蛻

羌活

木賊

草

各二兩

殺精草

蛇蛻

各一兩

右為末蜜丸如

彈子大每服一九細嚼茶清湯下

芎藭丸

蒼朮

二兩

白芷

二兩

甘草

三錢

細辛

藿香

防風

芎藭

二兩

川烏

一兩

右為末油餅劑為

九彈子大每服一九細嚼茶清下

四物猪肚丸

海螵蛸可一黃連可三重便右為末猪爛煮為丸

如梧桐子大每服四十九米飲湯送下

雄黃丸

雄黃錢二蒲黃炒當歸芍藥熟地

黃各一右為末酒糊丸陳皮湯下

二礬丸

白礬飛生礬各等右為末糊丸梧桐子大每

服七丸姜湯送下

當歸艾煎丸

當歸

艾葉

防風

桑葉

山藥

牛膝

從蓉

右半

右為末蜜丸如彈子大食

後細嚼白湯送下

調氣丸

密蒙花

西 蟬殼 西

石決明

小

桑葉

魚

防風

山藥

味無 甘菊

茯苓皮

青箱子

甘草

一

右

為末蜜丸

桐子大每服五十九茶清下

補肝丸

羌活

石決明

山藥

五味子

細辛

車前子 人參 茯苓 藁本各等分 右為

末煉蜜為丸梧子大每服三十九熱水下

夜光椒紅丸

川椒一斤 生地黄 熟地黄各一斤 右為末蜜丸

彈子大每服一丸細嚼溫酒下

真人五補丸

枸杞子 山梔 芍藥 薄荷各五錢 蒼朮

荊芥各四錢 右為末砂糖丸彈子大每服一丸細

嚼麥門冬湯送下

順肝丸

生地黃四兩大黃

當歸各二兩

皂角屑

瓜蒌

實三十右為末水煎皂角膏為丸梧桐子大每

服十九新汲水送下

### 熊膽丸

黃連二錢

礪砂子大角半冰片字一

麝仁去油密半兩

右五味為末將竹筒一箇入藥在內油紙縛定

用水三升新綿濾汁點

### 蝙蝠丸

飛蝠燒一箇

玄參可一

蚌粉兩一

桑螵蛸酒浸三十箇

右為末羊膽汁為丸如粟米大每服二十九猪

膽湯送下

决明丸

石决明

草决明

玄参

蝉退

蛇退

防风

甘草

羌活

各等分

為細末煉蜜丸

如鷄頭大食後茶清嚼下

百步通神丸

黄芪

兩半

知母

三兩

地骨皮

防风

遠志

人参

茯苓

大黃

略二兩

右為末煉蜜丸

如梧桐子大每服五十丸交門冬湯送下

五參丸

人參

玄參

丹參

苦參

沙參

各等分

右為末糊丸變門冬湯送下

麻黃生犀丸

麻黃

犀角

防風

枸杞子

當歸

石決明

楮實子

各等分

右為末糊丸茶清下

加味三黃丸

二十二間內用

黃連

黃柏

黃芩

大黃

門冬

生地黃

各等分

右為末糊丸白湯下

烏頭煎丸

枸杞子

生膝

各五錢

甘菊花

一兩

川烏頭

生用

生用

川芎

剉芥

羌活

地龍土

當歸

薄荷

白茯苓

冬五

右將牛膝以下十味為

細末用烏頭膏子和丸如桐子大每服二十九

空心茶酒送下

煎烏頭法

用青橘皮五錢去穰同烏頭黑為末以水一升

三合浸一宿微火煎成膏

桂仁膏

桂仁

半兩

燕夷

去一兩

杏仁

去皮

右三味各製入

乳鉢內研細入腦子少許研極細瀝去粗担成

膏子點之

硃砂膏

硃砂

研另

膩粉

研另

麝仁

去油

各

杏仁

去油

黃連

青鹽

研另

連翹

川椒

去油

各

等分

右為

細末

蜜調成膏點之

二霜膏

生薑

研汁

糖霜

四兩

右和勻點

青鹽膏

青鹽

滑石

黃連

乳香

各錢

硃砂

一字或加

右為

細末

和勻

煉蜜

成膏

點之

琥珀珊瑚膏

蘆甘石

海螵蛸

丹參

硃砂

當歸

白丁香

黃連

沒藥

乳香

青鹽

青礬

輕粉

各等分

右為末

蜜熬成膏點

退翳復明膏

明礬

砂

錢五

麝仁

三十箇

海螵蛸

玄胡索

射

各少許

右為末蜜調成膏以丈烟薰以竹篦挑

入砂銚內水一盞煎三錢綿瀝粗點

當歸活血煎

當歸

黃芪

炙

沒藥

白茯苓

川芎

龜活

蒼朮

菊花

熟地黃

麻黃

各半

右為末蜜丸如彈子大每服一九細嚼食

後茶清送下

人參茯苓煎

白茯苓

二續斷

西一人參

白附子

五錢

右

為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼陳

皮湯送下

菊花餅子

菊花

栢枝

各二

黑豆

去

蒼朮

各四

枸杞

子

炒一

右五味用水一碗煮乾為末糯米飯為

餅子如棋子大每服五餅細嚼茶清送下

# 燥門

有十二名

肺經主燥肺屬秋之陰金金體本燥能令燥者火也肺金乃陰之主為腎水之源而受火熱之邪寒水生化之源竭絕於上不能灌溉周身營養百骸熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也夫燥之為病血液衰少氣血不能暢而有枯涸乾勁皴揭諸症枯形容枯槁也涸者無水液也乾者不滋潤也勁者不柔和也皴揭者皮膚皴裂也此皆陰血為火熱所傷燥金主於收斂故為

筋脉勁強緊急口禁風癇發作者由熱甚風燥其  
風熱燥各有微甚不等所謂中風或筋緩者因其  
風熱勝濕而為燥乃燥之甚也或筋緩不收而痿  
痺故諸肢懈病痿皆屬肺金乃燥之化也譬如秋  
甚則燥燥甚則草木痿落而不收也

○總脉

沉澁微

○辨驗燥法

燥由水液衰少氣行壅滯不得通利滑澤遍  
身中外皆乾澁如唇燥大便乾毛髮落指甲

折身不柔和麻木皮膚起烈筋緊縮○燥加風熱其證筋脉勁強緊急口噤脾胃乾枯成消渴筋脉拘急惕搐煩滿閉結風癰昏冒強仆或中風筋緩燥之甚也

○治法

凡治燥降心火潤肺金清邪熱兼疎風藥少許  
凡治燥用當歸天門冬麥門冬黃芩黃連薄荷  
枳殼酥蜜麻仁生熟地之類

凡治燥要問曾經大病或吐或利用加減地黃  
凡如黑瘦人減去人參加白朮代之

凡治燥要問曾經房勞服補澁藥用黃栢知母  
少加木香為主藥

凡治燥要問平日喜食辛辣厚味炙燂用解散  
熱毒藥隨即淡薄滋味

凡治燥世或有言風熱為燥誤用辛涼驅風若  
泄之藥倍加燥其血液損之又損風燥之疾  
固有當求其本而治之

凡遇辯驗法內病症便用當歸潤燥湯為主隨  
症加減服之

當歸潤燥湯

諸燥  
通治

大黃

桃仁

麻仁

熟地黃

當歸

生地黃

甘草

各一錢

升麻

三分

紅花

五分

右水二

鍾煎至一鍾空心熱服

導滯通幽湯

便

當歸

桃仁

各錢五分

生地黃

熟地

各二錢

升麻

紅花

各錢

右用水二鍾煎至一鍾調枳榔末二

錢溫服

升麻瀉濕湯

治腰隔不利急氣裏急大便秘行

升麻

生地黃

熟地黃

蒼朮

青皮

黃柏

當歸

各一錢

黃芪

一錢五分

槐子

桃仁

麻草

各五分

右用水二鍾煎至一鍾食前熱服

麻黃白木湯

治大便閉小便赤身腫色黃麻木體熱發去衣溼更過振寒有時冰冷頭眩脈黑目中心流火冷換鼻塞小腹手按硬痛

麻黃

連節三錢

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

生甘

草

各二錢

神麴

升麻

柴胡

白朮

蒼朮

茯苓

澤瀉

人參

黃芪

桂枝

猪苓

杏仁

橘紅

黃柏

酒炒各五分

黃連

炙甘草

青皮

各三分

右用

水二鍾先入麻黃煎沸去沫下諸藥煎至一鍾

去粗食遠稍熱服

導氣除燥湯治小便秘或不通乃血

知母酒製 澤瀉錢各三 滑石末以茯苓錢各二 黃柏

酒製 右用水二鍾煎至一鍾空心稍熱服

活血潤燥丸治大便秘結

當歸 防風錢各三 大黃溫紙裹炭 羌活各一 桃仁

二兩湯泡 麻子二兩 皂角用子燒存性一兩半

右除桃仁麻仁另研餘藥為末和勻煉蜜為丸

如梧桐子大每服五十丸白滾湯送下三兩服

後大便日久不能結燥以磁器盛勿見風

潤腸丸治脾胃伏火大便或乾

麻子仁

桃仁

湯泡去皮

當歸尾

羌活

大黃

溫然累環

右除桃仁麻仁另研如泥餘藥

為細末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三五

十丸空心白滾湯送下

清涼飲子

治熱

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

用水

二鍾煎七分溫服

當歸龍胆丸

治熱

當歸

龍胆草

梔子

黃連

黃柏

黃芩

各一兩

大黃

蘆薈

各五錢已上諸藥俱要蒸熟

射分

青黛錢五 木香錢一 右為末煉蜜為丸如小豆大

每服三十丸淡姜湯送下

大秦朮湯治血虛不能運動筋骨燥

方見暑門

知地黃丸降大

方見注夏門治虛火動黑瘦人本方中或去人參

大補丸降火

方見虛損門

# 火熱門

有九十名

六氣所入風寒在下燥熱在上濕氣在中惟火遊行能發上下五行之中惟火有二心經為君火也右腎配三焦為相火也以名而言形質相生配於五行謂之君相書曰心君泰然百體從令君火一動相火熿然而從之天非此火不能生物人非此火不能有生君火之氣經以暑熱言之相火之氣經以暴悍酷烈言之相火易起易動無時不有變化莫測煎熬真陰陰虛則病陰絕則死經所謂一

水不勝五火者乃五臟之火五志激之其火隨起  
臟腑之火有虛有實故言治火為難且前人備述  
其詳全在臨病處方庶免實實虛虛之禍也

○生脉道二

浮大

○死脉道二

沉遲

○不治症名二

火起湧泉穴 陰虛火動人

○死症名三

心火自焚死 煎熬真陰陰絕死

虛火旺盛若正治立死

○傷風傷寒發寒發熱

凡傷寒門

○辨發熱在內中外

○輕手捫之熱甚重手捫之反不覺其熱其熱在皮毛血脉

○輕手捫之微熱重手捫之熱甚其熱在筋骨

○用手不輕不重捫之熱者其熱在肌肉

○辨分晝夜熱

晝發熱夜安靜是氣盛

夜發熱晝安靜是氣陷血分

晝夜發熱是氣存血亡急瀉其氣峻補其血

○辨分潮熱

斗旦潮熱肺氣主之用白虎湯加黃芩

寅卯時

日晡潮熱腎氣主之地骨丹皮知母黃柏

酉時

辰戌時潮熱黃芩黃連生甘草羌活

巳午時潮熱黃芩黃連生甘草

未時潮熱用黃芩黃連生甘草石膏

申時潮熱黃芩黃連生甘草柴胡升麻

亥時潮熱黃芩黃連生甘草當歸

○治火法後開

○治熱法後開

心火為病二十名

身熱 惡寒 戰慄 驚惑 譫語 妄言

驚悸 怔忡 結核 癰亂 瞽悶 鼻塞

衄血 溫血 吐酸 暴注 下迫 轉筋

喘 嘔 癰 疰 瘡 小便濁

瘤 淋 閉 悲 笑 腹如鼓

相火為病二十六名

暴死 暴病 暴瘡 躁擾 狂越 罵詈

驚駭 喉痺 僵仆 目昧 耳鳴 瞶瘵

暴注 氣逆 禁慄 跗腫 瘡瘍 嘔逆

昏不知人 如畏神守 時眩仆

洒淅惡寒 洒淅振寒 食不下

不避親疎神明

心火

喜則火起於心 諸痛痒瘡

本經

有餘火用黃連 不足火用人參黑瘦人去人

參白朮代茯神菖蒲

小腸火

其症瘧痢淋瀝赤白帶濁

有餘火木通

不足火生地

肺火

悲則火起於肺

諸氣臍脅痠

本經正病

有餘火用枯苓

不足火用人參天門冬麥門

冬五味子

大腸火

其症在右胎前痛便閉不通

有餘火條苓

不足火天門冬

脾火

醉飽火起於脾

諸濕腫滿

本經正病

有餘火芍藥

不足火白朮白芍藥

胃火

其症下寒  
嘔頭眩

有餘火石膏

不足火陳皮甘草人參黑瘦

人去人參白朮代之

肝火

怒則火起於肝

諸風掉眩

本經  
正病

有餘火用柴胡

不足火天麻川芎

膽火

其症目黃口  
苦坐臥不安

有餘火龍胆草

不足火酸棗仁

腎火

左

房勞火起於腎

有餘火知母

不足火熟地遠志丹皮

膀胱火

其症小腹不利

有餘火黃柏

不足火玄參

命門火

右

有餘火山梔

炒

不足火玄參

三焦火

其症頭暈手足心熱

上焦有餘火熱山梔

不足火知母炙甘草

中焦有餘火熱大黃

不足火黃芩炙甘草

下焦有餘火熱黃柏

不足火黃柏炙甘草

火起湧泉穴

此病十不收一熱脚下起入腹者虛之極也用  
四物湯加玄參黃柏山茱萸煎服又以附子為  
末津調塗腳底心用布裹之

肌熱煩熱

肌膚間熱心煩面赤食少喘咳有痰右關脈緩  
弱或浮數○服瀉陰升陽湯

四肢熱左心煩熱

熱伏脾胃或血虛得之或胃虛多食冷物得之  
○服火鬱湯

手背發熱

見傷寒門

手心發熱

用山梔香附蒼朮白芷半夏川芎神麴糊姜汁  
為丸如菉豆大每服一錢五分白滾湯送下

骨蒸癆熱

五臟齊損自汗發熱盜汗下血○見癆瘵門

骨蒸寒熱

大便如常脉細數食少○用八珍湯加知母黃

柏

虛熱

不能食自汗氣短屬脾虛○用甘寒溫劑

實熱

能食口乾口燥大便難○用調胃承氣湯

○治火法

凡心火正治

凡相火可治

凡火輕可降

凡火重可發

即是發汗  
自左何經

凡氣有餘便是火

凡青皮收五臟之火

凡氣從左起肝火

凡用玄參去無根火

凡氣從臍下起陰火

凡用山梔去心腎火

凡臟腑火瀕論虛實 凡鬱火可發當看何經  
凡虛火旺盛者以生薑汁與服若正治立死  
凡不足之火用滋其陰火自降炒黃柏生地  
凡人壯實火盛顛狂者可用正治  
凡火急甚者必用緩之甘草為主  
凡火盛不可驟用寒涼必須溫散

○治熱法

凡痰熱能生異症 凡用涼膈散退六經熱  
凡暴熱病在心肺 凡鬱熱病貝母滑石炒  
凡積熱病在腎肝

凡用軟石膏煨研末醋丸菜豆大大瀉胃熟食  
積痰火

凡濕熱相火為病多諸病要尋看有無痰飲并  
火熱挾

凡陰火發熱用四物湯加黃柏知母降火補陰  
之妙劑

凡陰火甚者用龜板酥炙為主藥如氣虛加白  
朮黃芪

喻化三黃丸

大黃

黃芩

黃連

各二兩半

山豆根

黃柏

苦參

礪砂

各一兩

京墨

錢三

片腦

錢半

麝香

黃藥子

白藥子

各一兩半

右為末用猪胆汁調勻

攤在瓦盆內蒸三次露一宿入腦射礪砂為丸如豆大每服一丸食後嚙化冬月加知母

神芎丸

大黃

黃芩

各一兩

牽牛

取頭末

滑石

各二兩

黃連

薄荷

川芎

各二兩半

右為末滴水丸如梧桐子

大每服五十丸食後白滾湯送下

三黃丸

黃連

黃芩

大黃

俱炒各十兩

右為末蜜丸

如梧桐子大每服四十丸白滾湯送下

酒煮黃連丸

黃連

洗半斤

用酒二升浸用瓦器貯藥甑上蒸屢

蒸屢晒酒乾為度晒乾為末滴水為丸如梧桐

子大每服五十丸食前白滾湯送下

人參瀉肺湯

人參

黃芪

梔子

枳殼

薄荷

連翹

杏仁

炒去尖

桑白皮

炒

大黃

桔梗

甘草

炙

右作一服水二鍾半煎至一鍾食後

服

涼膈散

大黃

錢二

連翹

錢四

黃芩

炒

山梔

薄荷

朴硝

甘草

錢各一

右用水二鍾蜜一匙竹葉

十片煎至一鍾溫服

洗心散

白朮

錢一

麻黃

當歸

荊芥

大黃

芍藥

甘草

錢各二

右作二服每服水二鍾生

姜三片薄苽少許同煎至一鍾不拘時溫服

甘露飲

枳殼

炒

石鑊

枇杷葉

熟地黃

黃芩

麥門冬去心 山梔

茵陳

天門冬

去木皮

甘草

各錢二

右分作二服每服水二鍾煎至一鍾

食後服

消毒犀角飲

防風

錢一

荊芥

甘草

各錢二

鼠粘子

炒錢三

右

用水二鍾

煎至一鍾溫服

瀉

陰火升陽湯

治肌熱煩熱面赤食少

柴胡

半兩

人參

黃芩

各錢七

石膏

煨冬下

錢五

秋

黃連

炒錢五

黃芪

蒼朮

米泔一兩

浸炒

共為粗末

每服水二鍾

煎至八分

綿利去粗服

黃連解毒湯

黃連

兩

黃芩

炒

黃柏

炒

枳實

四

右分作

一服每服用水二鍾煎至一鍾服

火鬱湯

羌活

升麻

葛根

芍藥

人參

柴胡

甘草

炙

五錢

防風

半

二錢

葱白

三

右分作

四服每服水二鍾煎至八分服

八珍湯

即四君子湯四物湯合用

調胃承氣湯

見脾胃門

四物湯

見諸血門

# 積熱門

有八名

積熱者熱毒蘊積於內也因徇情縱慾以致積熱  
非一朝一夕之過或有體氣素實一時感觸熱毒  
之氣者或有酒麪煎煉雄附峻補諸熱鬱積臟腑  
之間或在心肺之內且以積熱治法言之始而涼  
取次而寒取寒取不愈則因熱從之從之不愈則  
枝窮矣凡熱皆出於心熱甚則能傷血或先服三  
黃丸洗心散或噙化三黃丸四順清涼飲此皆前  
人立論處方後人須分陰陽虛熱實熱陰盛格陽

之熱如槩以積熱症治之則反誤多矣

○虛實脉

浮大虛三脉為虛 洪細小三脉為實

○難治脉

沉細數三脉難治 病熱有人者可治脉洪

是也 無火者難治是脉沉細

○治法

凡小熱之氣涼藥和之

凡大熱之氣寒藥治之

凡甚熱之氣發汗解之

凡甚熱發汗不盡姜治

熱名曰後黑治

積熱

大小男婦積熱其症以舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘塞小便不利一切風熱○服涼膈散

胃中積熱

牙宣齬腫咽膈乾燥吐血腥臭或受濕伏熱在裡身黃如疸○服甘露飲

積邪熱

大小男婦痰涎壅滯或腮頰結核遍身生瘡癰

已潰未潰○服消毒犀角飲

心經積熱

大小男婦咽乾口燥目赤睛痛大小便赤色或  
閉或瀉○服神芎丸

肺經積熱

喘咳軟脇膈脹滿痰多大便澀○服人參瀉肺  
湯

脾肺二經積熱

虛煩上壅咽喉生瘡○服利膈湯

三焦積熱

咽喉腫閉心膈煩躁小便赤 大便閉○服三  
黃丸

積酒熱

因酒太過○服酒煮黃連丸

涼膈散

見火熱門

甘露飲

見火熱門

神芩丸

見火熱門

消毒犀角飲

見火熱門

人參瀉肺湯

見火熱門

酒煮黃連丸

見火熱門

三黃丸

見火熱門

利膈散

開末卷

# 中寒門

有六名

寒者天地殺厲之氣在天為寒在地為水在人為  
腎故腎司寒倉卒受邪且速且危蓋由胃虛觸胃  
大寒其症初發便拘急攣痛昏不知人四肢厥冷  
禁固僵直無所知覺牙緊口噤與中風相似其脉  
弦絃或沉細名曰中寒非比傷寒為病循經入表  
傳裡若內外俱虛寒邪獨盛日晰色青白自汗或  
下利名曰內脫治之稍緩脉散而死人能知命而  
保身者冬月早卧晏起必待日出乃去寒就溫安

有中寒之患且如辛苦之人饑寒勞役不避風雪  
觸冒嚴寒卒然病者五臟皆有所中中不自知但  
傷寒自覺何時日所傷必先頭痛身熱惡寒無汗  
骨節疼痛此是傷寒也當以傷寒法內治之惟中寒  
時刻之間便有挾風兼濕為軀虛甚又逢天道之  
虛兩虛相應則傷五臟不可妄行汗吐下三法治  
以附子理中湯藥始可救也

○中寒脉

絃緊沉細遲

兼風脉浮

兼濕脉濡

○死症名一

內脫

中寒

初病便拘急攣痛昏不知人四肢冷僵直牙緊口噤服附子理中湯又用熨法

中寒嘔吐

服姜桂湯

外感風寒內傷生冷

服人參養胃湯

中寒腹痛

服理中湯

中寒乾嘔

服沉附湯

內脫

目睛色青白自汗或下利為內外俱虛寒邪獨盛名曰內脫多致不治理服附子理中湯

姜桂湯

乾姜煨

良姜

各錢五分 辣桂

木香

甘草

半夏麴

二錢

右用水

二鍾姜三片煎至一鍾服

附子理中湯

附子

皮去

乾姜

煨

人參

白朮

各二錢

甘草

錢一右用水二鍾煎至一鍾食前服如血少加  
當歸一錢

理中湯

人參

乾姜

炮

甘草

炙

白朮

炒

錢各

右用

水二鍾煎至一鍾不拘時服

沉附湯

附子

炮

去

乾姜

錢各

半

白朮

炒

沉香

錢各

右用

水二鍾煎一鍾食前服

灸法

肥慈

細切

麩皮

炙

二

食鹽

兩

右

三味

入水

一大

益和勻分作二次炒極熟用絹作二包將一包

熨臍上一包冷易如乾添水拌

參養胃湯

甘草

茯苓

草果

橘皮

各錢二分

蒼朮

米泔炒

厚朴

姜汁炒

半夏

姜汁製

右

用水二鍾烏梅一箇煎至一鍾不拘時服

# 痼冷門

有四名

痼冷者年久謂之痼寒極謂之冷人之臟腑稟賦厚薄不同亦有調理失宜者如真氣衰微脾胃之氣不足必致胃寒或食冷物粘膩難化生硬之類累月積久以成痼冷之疾前人立論致詳後之用藥隨證依經則無夭闕之禍矣

○總脉

遲

沉

○治法

先用熨法可治

陽虛陰盛

其症大便洞泄小便頻數鼻多清涕吐涎沫水穀不化腸胃絞痛肚腹如冰洒洒淅淅口尿沉香華茹散

陰毒

又傷寒冷手足冷腰背強臍腹築痛咽喉不利嘔吐下利身如被杖脉細欲絕此由腎虛寒外傷風冷口服洞陽丹

陰勝

四肢逆冷額上手背冷汗出不止或眼不堪唇  
口手足爪甲俱青脉沉細伏匿○服附子理中  
湯

脾胃積冷

手足厥冷畏冷增寒飲食不化或嘔吐咳嗽或  
癰疽大作○服金鎖正元丹

沉香萸茄散

沉香

華澄茄

附子

炮去  
皮

葫蘆巴

炒

肉桂

補骨脂

炒

川練子

去  
核

茴香

炒

巴戟

心

木香

各一  
錢

桃仁

炒去  
尖

川烏

炮去  
皮

右用

水二

鍾食鹽少許煎至一鍾不拘時服

洞陽丹

陽起石

煨火

硃砂

各五錢

鍾乳粉

附子

炮

去皮

切

用酒

川烏

炮

去皮

天雄

炮

去皮

切

用酒

煮

取汁

和

末

神

麴

糊

為

丸

如梧桐子大每服五十丸空心淡鹽湯送下

附子理中湯

見中寒門

熨法

見中寒門

金鎖正元丹

開

末